



ÚMIT

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ТОМОТЕРАПИИ



Казахстан, г. Астана,
ул. Абылай-хана, 42/1



Call-центр:
+7(7172) 954 484
+7 777 201 44 44
+7 702 201 94 44



tomo.kz



info@tomo.kz



tomocenter.kz



tomocenter.kz





ÚMIT

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ТОМОТЕРАПИИ

Подготовка пациента на ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЮ (ЭГДС)

- ✓ Исследование проводится строго натощак! Между последним приемом пищи и ЭГДС должен быть обязательный перерыв от 10 до 12 часов.
- ✓ Утром также не рекомендуется курить и принимать вовнутрь лекарственные препараты в виде таблеток или капсул.
- ✓ Разрешено перед ЭГДС: чистить зубы; выполнять другие исследования (например, УЗИ); делать инъекции, если это необходимо именно утром; принимать медикаментозные средства, которые можно рассасывать в ротовой полости; за 2–4 часа до проведения процедуры можно пить воду без газа.
- ✓ Если пациент принимает препараты, влияющие на свертываемость крови (антикоагулянты: гепарин, натрия гидроцитрат, неодикумарин, синкумар; антиагрегантные средства: ацетилсалициловая кислота, дипиридамо, пентоксифиллин, тиклопидин), необходимо накануне проконсультироваться с врачом, назначившим эти лекарственные средства, с решением вопроса о предстоящем исследовании с возможной биопсией.
- ✓ За 5 дней до процедуры пациенту необходимо избегать приема железосодержащих препаратов, активированного угля, висмут содержащих препаратов.
- ✓ Пациент с собой должен иметь анализы на гепатит В,С; ВИЧ-инфекцию (давностью не более 3х месяцев); лекарства, которые принимаются постоянно, которые можно выпить сразу после процедуры. Также необходимо взять, если имеются, предыдущие данные обследований. Если у пациента имеется аллергия, он должен обязательно поставить в известность доктора.

ⓘ **Важно:** пациентам с эпилепсией выполнение ЭГДС показано только в условиях внутривенной седации! Пациентам с аритмией, перенесенным инфарктом миокарда, инсультом следует накануне проконсультироваться с кардиологом и неврологом. Пациентам с сахарным диабетом необходимо записаться на ЭГДС в утренние часы и взять принимаемые лекарственные препараты с собой (таблетированные формы, инсулин). Обязательно проконтролировать уровень глюкозы перед исследованием. Проверить уровень глюкозы крови утром перед исследованием. Пациентам с бронхиальной астмой необходимо взять с собой ингалятор.